



PITIRIASIS ROSADA

- La Pitiriasis Rosada es una dermatosis eruptiva, pseudoexantemática,
- Es frecuente y benigna
- De curso agudo o subagudo
- Evolución clínica y resolución espontánea

CLÍNICA

- Cursa como un exantema infeccioso (pseudoexantema)
- Comienza por una placa ovalada, con zona central rosado-amarillenta, superficie plegada, apenas descamativa
- Presenta característicamente un halo eritematoso con un collarete escamoso delicado por dentro de su contorno.
- Es la PLACA HERÁLDICA O MADRE
- Permanece estable 1-2 semanas y desaparece



- Aparecen luego placas similares pero de menor tamaño en forma sucesiva
- Distribución simétrica y metamérica en especial en el tronco
- Tendiendo a respetar cuero cabelludo, palmas, plantas y cara.
- La erupción tiene sentido descendente o ascendente según la localización de la placa heráldica (tronco superior o raíz de miembros inferiores respectivamente)



- ◉ Evoluciona de manera espontánea y sin secuelas en 4 a 6 semanas.
- ◉ Puede dejar hipo o hiperpigmentación residual
- ◉ Recidiva sólo en 1-2 % de los pacientes

- ◉ Se cree que sería de origen viral aunque el virus no se identificó
- ◉ Podría ser **virus herpes simple 7**

TRATAMIENTO

- La exposición solar o a rayos ultravioleta B acorta la evolución
- El PRURITO (que puede producirse por baños prolongados) suele mejorar con aplicación de cremas humectantes o administración de antihistamínicos

“ LA PITIRIASIS ROSADA SE MIRA Y NO SE TOCA ”